

#EstrategiaCáncerAndalucía

#SaludPúblicaAndalucía

CRIBADO DE

CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO en Andalucía

Muévete contra el cáncer



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia


Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE CÉRVIX O DE CUELLO DE ÚTERO?

El cuello del útero es la parte más inferior del útero que asoma en el fondo de la vagina. El cáncer de cérvix o de cuello del útero ocurre cuando las células de esta zona se vuelven anormales y empiezan a crecer de forma descontrolada.

¿CUÁL ES SU CAUSA?

La causa principal es la infección persistente por **Virus del Papiloma Humano (VPH)**. El VPH se contrae generalmente a través de un contacto sexual (el 80% de las mujeres lo contraen), en la mayoría de los casos desaparece al cabo del tiempo pero en algunas mujeres (10-15 %) no desaparece, teniendo más riesgo de desarrollar cáncer de cuello del útero.

Esta infección **no produce molestias o síntomas**, por tanto, la manera de saber su existencia es a través del cribado.

¿Significa que mi pareja actual me está engañando? No hay forma de saber con certeza cuándo se contrajo el VPH o quién se lo transmitió, por tanto, tener el VPH no significa que la paciente o su pareja estén teniendo una relación sexual con otra persona.

Este tipo de cáncer tarda más de 10 años en desarrollarse, por lo que disponemos de un plazo prolongado para detectarlo, tratarlo y curarlo.




Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



¿CÓMO PUEDO PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?



Usando **preservativo** se reducen las posibilidades de transmisión, aunque no las elimina totalmente, ya que el VPH puede afectar a zonas no cubiertas por el preservativo.



Vacunándote frente al VPH protege eficazmente frente a los principales tipos de VPH que causan lesiones premalignas y malignas de cérvix. Actualmente la vacuna está incluida en calendario. Ciertos tipos de VPH son resistentes a la vacuna, por eso es importante que las mujeres vacunadas acudan a hacerse el cribado.

Más información en www.andavac.es



Mediante el cribado, a través de la citología, es posible detectar precozmente las células cervicales anómalas, pudiendo ser tratadas antes de que el cáncer aparezca.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CRIBADO DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?

Se trata de una prueba inocua e indolora. Se introduce en la vagina un espéculo que recoge células del cuello del útero para su posterior análisis en laboratorio mediante citología y detección de VPH. Así se detecta precozmente a mujeres portadoras de lesiones premalignas.

El cribado reduce la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero un 70-80%



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



¿CON QUÉ EDAD DEBO REALIZAR EL CRIBADO?

El cribado se realiza a mujeres entre 25 y 65 años.

Las menores de 25 años y mayores de 65 no precisan este cribado porque es muy poco probable que desarrollen cáncer.

En las adolescentes, aunque hayan comenzado relaciones sexuales, la prueba citológica puede dar resultados alterados por las modificaciones fisiológicas propias de la edad.

Tampoco deben hacerse este cribado a aquellas mujeres que no hayan tenido relaciones sexuales o a las que se les ha extirpado el útero por procesos benignos.

El programa de detección es muy efectivo para identificar lesiones precursoras disminuyendo la probabilidad de desarrollar el cáncer de cuello de útero



mujeres entre
25 y 65 años

¿TENGO QUE HACER ALGO EL DÍA DE LA PRUEBA?

El día de la cita no se debe estar con la regla. Se debe haber finalizado la menstruación al menos cinco días antes de la prueba. Hay que llamar al centro de salud para cambiar la cita si se encuentra en esta situación. Además, ten en cuenta:

- Abstenerse de relaciones sexuales 48 horas previas a la toma.
- No hacer lavados vaginales ni con desodorantes vaginales en las últimas 24 horas.
- No usar tratamientos tópicos (óvulos, cremas, etc..) en 5-7 días antes de la prueba.
- El uso de anillo vaginal no interfiere en la prueba

ME HAN DICHO TENGO VPH POSITIVO ¿SIGNIFICA QUE TENGO CÁNCER?

Un resultado positivo significa que tiene un tipo de VPH que podría estar relacionado con una lesión de cuello del útero.

A través de Salud Responde se le citará para realizar las pruebas correspondientes.

EN MI SEGUNDA CITOLOGÍA TRAS VPH POSITIVO VUELVE A SALIR POSITIVO ¿TENGO CÁNCER?

Tranquila, este tipo de cáncer tarda más de 10 años en desarrollarse por lo que se cuenta con un plazo prolongado para detectarlo, tratarlo y curarlo.

En este caso se te derivará a consulta específica de Ginecología para hacerte una prueba llamada colposcopia para conseguir un diagnóstico definitivo.

Muévete contra el cáncer



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

